



Merkblatt Zecken

ஓட்டுண்ணி குத்துதல்: அதன் ஆபத்தும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும்

பாடசாலை மருத்தவ திணைக்களத்தின் அறிவிப்பு

அன்பான பெற்றோர்களை

ஒவ்வொரு குளிர்காலம் முடிந்த பின்னர் பிள்ளைகள் இவர்களது பொழுதுபோக்கு வேலையிலும் பாடசாலையுடனும் அல்லது பாலர் பாடசாலையுடன் வெளியில் சென்று இயற்கையை பார்க்க சந்தோசப்படுவார்கள். இவ்வேலையில் ஓட்டுண்ணிகளினால் உங்கள் பிள்ளைகள் குத்தப்படலாம். அனைத்து சுவீஸ்லும் அண்மை நாடுகளிலும் சுமார் 1500 மீற்றர் கடல் மட்ட உயரத்திலிருந்து அனைத்து குலைகள்/ சருகுகள் கொண்ட காடுகளில் ஓட்டுண்ணி உயிர்வாழ்கின்றன. ஓட்டுண்ணிகள் மரப்பத்தைகளுக்குள்ளும் நிலத்திலிருந்து 1.5 மீற்றர் உயரம் வரை வாழுகின்றன. இதனூடாக ஊடுருவி போகையில் தொத்திக் கொள்ளுகின்றன. ஓட்டுண்ணி காலமானது இலைத்துளிர் காலத்திலிருந்து (மாசி மாதம்) இலையுதிர் காலம் (ஜப்பசி கார்த்திகை மாதம்) வரையாகும். ஓட்டுண்ணிகள் இரண்டு ஆபத்தான வருத்துங்களை விளைவிக்கலாம். இது ஏற்படுவதற்கு சாத்தியம் குறைவாக இருந்தாலும், கீழ் கருதப்படும் நோய் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. இங்கு நீங்கள் இதையிட்டிய முக்கிய விபரங்களாகிய ஆபத்தையிட்டியும் அதனை தடுப்பதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அறியலாம்.

ஓட்டுண்ணியினால் பரவப்படும் நோய்கள்

லிமே-பொறலியோச(Lyme – Borreliose) : ஓட்டுண்ணிகள் அனைத்து சுவீஸ் நகர பகுதிகளிலும் பொறலியோச என்னும் நோயை பரப்பலாம். ஆனால் அப்படியிருந்தும் பத்தில் ஒரு ஓட்டுண்ணியால் குத்தப்பட்ட நபருக்கு இந்நோய் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன. ஓட்டுண்ணி குத்தி சிறிது நாட்களின் பின்னர் காய்ச்சல் , சலிக்காய்ச்சல் வருமாயின் அல்லது உண்ணி குத்திய இடத்தில் அல்லது உடலின் வேறு பகுதிகளில் வட்ட வடிவமாக சிவந்து இருக்குமாயின் உங்கள் வீட்டு அல்லது சிறுவர்-மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும். இந்நோயை அன்றியோடடிக்கா மூலம் குணப்படுத்தலாம்.

ஓட்டுண்ணியினால் ஏற்படும் மூளையழர்ச்சி (Zeckenenzephalitis) இந்நோயை கோடைக்கால ஆரம்பத்தில் - மெனிங்கோ மூளையழர்ச்சி, FSME என்றும் அழைப்பர்.

சுவீஸ் நாட்டில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே இம்மூளையழர்ச்சி நோயை உருவாக்கும் நச்சுக்கிருமிகள் கொண்ட ஓட்டுண்ணிகள் வாழுகின்றன. (பின்பக்கத்தில் இக்கிருமிகள் FSME வாழும் இடங்களை குறிக்கப்பட்டுள்ளன). இவைகள் மனிதனுக்கு நோய்களை பரப்பலாம். அனைத்த குறிச் மாநகரத்தில் இக்கிருமி பரவுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. 1000 தொடக்கம் 4000 வரை குத்தப்பட்ட ஓட்டுண்ணியில் சுமார் ஒரு தடவை இவ்வாறு கருதப்பட்ட இடங்களில் இந்த ஆபத்தான மூளையழர்ச்சி (Zeckenenzephalitis) நோய் ஏற்படுகிறது. ஓட்டுண்ணி குத்தி சில நாட்களுக்கு பின்னர் தலைவலி, காய்ச்சல், களைப்பு ஏற்படுமாயின் உங்கள் வீட்டு அல்லது சிறுவர்-மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும். இந்த ஓட்டுண்ணியால் ஏற்படும் மூளையழர்ச்சிக்கு எதிராக தடுப்பூசி போடலாம். (கீழே பார்க்கவும்)

ஓட்டுண்ணியினால் ஏற்படும் மூளையழர்ச்சி (Zeckenenzephalitis/ FSME)

முற்கூட்டியே எதிர் நடவடிக்கையும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும் நன்கு உடலை மறைத்த உடை(நீளமான காற்சட்டை, முழு கை கொண்ட சட்டை) பூச்சி ஸ்பிரே, முடிந்த வரை பத்திரகையையோ யுற் பதர்கையையோ, மரபட்டைகளின் பக்கத்தையோ தவிர்க்கவும். மரப்பட்டை பகுதிகளுக்கு சென்ற பின்னர் உடல் அனைத்தையும் ஒட்டுண்ணி உள்வதா என தேடவேண்டும். பேற்றோர்கள் பிள்ளைகளின் தலையில் ஒட்டுண்ணி உள்வதா என கவனிக்க வேண்டும். ஒட்டுண்ணி சூத்தனாள் நோவு ஏற்படாது. அதனால் அவதானிப்பது சூறாவடி இருக்கும். உண்ணியை உடலில் கண்ட பின்பு இருக்கிற(பின்செறி) மூலம் தோலுக்கு அடியில் ஆழமாக வைத்து உண்ணியை நோராக இருத்தெடுக்க வேண்டும். ஆதன் பின்னர் அந்த இடத்தில் கிருமியை அழிக்கும் மருந்தை பூசவும். ஒட்டுண்ணிக்கு மேல் எண்ணெய் அல்லது பசை அல்லது வெசின் தடவக்கூடாது. சூத்திய இடத்தையும் தீகதியையும் பேனாவினால் சூறித்து வைக்கவும்.

ஒட்டுண்ணியினால் ஏற்படும் முளையழர்ச்சி (Zeckenenzephalitis/ FSME) நோய்க்கெதிரான தடுப்பூசி FSME என்னும் நோய் கடந்த பல வருடங்களாக அதிகரித்த வன்னமுள்ளன. இக்காரணத்தினால் வளர்ந்தோர்களையும் 6 வயதிற்கு மேற்பட்ட சிறுவர்களையும் FSME என்னும் கிறுமி அடங்கிய ஒட்டுண்ணி வாழும் இடத்தில் வசிப்பவர்களை அல்லது இப்பகுதிகளுக்கு கூடுதலாக செல்பவர்களை இந்த FSME நோய்கெதிராக தடுப்பூசி போட அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த அறிவுரை 2006 இலதுளிர் கால பகுதியில் அனைத்து குறிச் நகரத்திற்கும் செல்லுபடியாகும். இத்தடுப்பூசி 6 வயதிற்கு கீழ்ப்பட்ட சிறுவருக்கு பொதுவாக அறிவுரை செய்யப் படவியல்லை. முழுமையான தடுப்பூசியினால் ஏற்படும் பாதுகாப்பிற்கு 3 தடவை தடுப்பூசி போட வேண்டும். 2வது தடுப்பூசி போட்ட பின்னர் குறைந்த பட்சம் 4 தொடக்கம் 6 கிழமைக்கு பின்னர் தான் முழுமையான தடுப்பு பாதுகாப்பு தொடங்குகிறது. இக்காரணத்தினால் 1வது தடுப்பூசியை ஒட்டுண்ணி காலத்திற்கு முன்பு போடுவது சிறந்ததாகும். நீங்கள் தடுப்பூசிக்கு பொறுப்பானவர்களிடம் அல்லது வீட்டு மருத்துவரிடம் அல்லது சிறுவர்-மருத்துவரிடம் இதற்கான அறிவுரையை பெறலாம்.

மேலதிக கேள்விகளுக்கும் தகவல்களுக்கும்

உங்களது பாடசாலை மருத்துவரிடம் அறியலாம்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு www.vsa.zh.ch -> Downloads -> Schularzt

ஒட்டுண்ணியினால் ஏற்படும் முளையழர்ச்சி (Zeckenenzephalitis/ FSME) காணப்படும் வட்டாரங்கள் (பாங்குள் மாத நிலை 2006)

Zürich அனைத்து மாகாணம்

Aargau Rheinfelden, Möhlin, Wallbach, Bezirk Laufenburg, Koblenz, Döttingen, Zurzach, Birr, Brugg, Würenlingen, Baden, Wettingen, Rothrist, Zofingen, Brittnau, Gontenschwil, Schöftland, Muhen, Gränichen

Bern	Gampelen, Erlach, Grosses Moos, Lyss, Jens, Port, Mühleberg, Kriechenwil, Belp, Münsingen, Steffisburg, Thun, Spiez, Frutigen, Erlenbach, vorderes Simmental
Fribourg	Salvenach, Ulmiz, Kerzers
Graubünden	Fläsch, Luziensteig, Grüşch, Seewis
Luzern	Reiden, Langnau, Dagmersellen, Nebikon, Egolzwil, Kottwil, Sursee, Knutwil
Nidwalden	Stans, Buochs, Bürgenstock, Stanserhorn
Obwalden	Kerns, Stanserhorn
Schaffhausen	Hallau, Osterfingen, Neuhausen, Beringen, Schaffhausen, Stein am Rhein
Solothurn	Bellach, Lommiswil, Langendorf
St. Gallen	Jonschwil, Zuzwil, Niederhelfenschwil, Mörschwil, St. Magrethen, Balgach, Wagen, Jona, Mels, Sargans, Vilters
Thurgau	Diessenhofen, Basadingen, Ermatingen, Kreuzlingen, Warth, Weiningen, Herdern, Nussbaumen, Frauenfeld, Steffurt, Weingarten, Thundorf, Lommis, Aadorf, Wängi, Affeltrangen, Oppikon, Friltschen, Weinfeld, Zihlschlacht, Kesswil
Waadt Cu	drefin, Salavaux
Zug	Steinhausen
FL	Balzers, Vaduz, Nendeln

மேலதிக ஓட்டுண்ணி தகவல்களுக்கு கீழ்வரும் விபரங்களை கவனிக்கவும்.

<http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01114/index.html?lang=de> des Bundesamtes für Gesundheitswesen, www.zecke.ch oder www.zecken.ch

“Vorsicht bei Zeckenstich” – என்னும் தகவல் புத்தகத்தை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். SUVA என்னும் காரியாலயத்தில் லூர்சன் என்னும் இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். (மத்திய வாடிக்கையாளர் தொலைபேசி இல : **041 419 58 51** அல்லது www.suva.ch/waswo) மூலம் அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளலாம்.

Zürich, 31.08.2006 fdi/tr